

망막박리

(Retinal Detachment)



GILBERT FAMILY EYECARE

T. LANCE WILLIAMS, O.D.
RICHARD E. WOOD, O.D.
4915 E. Baseline Rd., Ste. 115
Gilbert, AZ 85234

(480) 279-4400

수술 후 시력회복

시력회복은 수술 전 망막상태, 망막박리 정도, 망막이 떨어져있던 기간등과 관련이 있습니다. 즉, 수술 전 망막의 상태가 건강하지 못한 경우라면 수술로써 망막을 다시 붙이더라도 시력이 많이 좋아지지 않습니다. 또한 망막이 떨어진 범위가 좁을수록 성공률이 높습니다. 하지만 중심시력을 담당하는 황반부가 떨어진 경우에는 수술 후에도 예전 시력을 완전히 회복하기는 어렵고 망막박리의 기간이 길수록 회복 가능성은 더욱 낮아지게 됩니다. 따라서 가능한 빠른 시일 내에 수술을 받는 것이 좋습니다.

합병증

모든 수술에는 수술에 따른 합병증이 있습니다. 망막박리수술 역시 망막박리의 재발, 안내염, 유리체출혈, 녹내장, 백내장 등 합병증이 생길 수도 있습니다. 망막박리는 병의 특성상 조기진단, 조기치료하여 망막이 성공적으로 붙으면 어느 정도의 시력을 회복 할 수 있으며, 안구 유지에도 별 문제가 없습니다. 그러나 수술을 하였어도 망막의 신경세포가 많이 손상된 경우에는 상당한 시력 감소가 올 수 있으며, 망막이 제 자리에 붙지 않은 경우에는 드물지만 실명에 이를 수도 있고, 안구 위축이 생길 수 있습니다.